




BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS EM
CARDIOLOGIA






Programa de Reconhecimento Hospitais BPC

Dr. Denilson de Albuquerque, MD, MSc, PhD






Insuficiência
Cardíaca



Fibrilação Atrial
Hospitalar



Síndrome Coronariana
Aguda



Fibrilação Atrial
Ambulatorial

- ✓ IECA/BRA na alta hospitalar
- ✓ Beta bloqueadores na alta hospitalar
- ✓ Medida da função VE
- ✓ Agendamento de visita de retorno na alta hospitalar
- ✓ Antagonista da Aldosterona na alta hospitalar



- ✓ Definição do perfil hemodinâmico na admissão hospitalar
- ✓ Orientações de alta
- ✓ Aconselhamento à cessação do tabagismo
- ✓ Controle de peso durante a internação hospitalar
- ✓ Anticoagulação para Fibrilação/Flutter Atrial
- ✓ Profilaxia trombose venosa profunda (TVP)
- ✓ Nitrato + hidralazina na alta hospitalar
- ✓ Ivabradina na alta hospitalar
- ✓ Recomendação de vacinação na alta hospitalar



- ✓ Aspirina precoce
- ✓ Aspirina na alta hospitalar
- ✓ Betabloqueador na alta
- ✓ IECA/BRA na alta hospitalar na disfunção sistólica do VE
- ✓ Estatina na alta hospitalar
- ✓ Controle de pressão arterial
- ✓ Cessaç o do tabagismo
- ✓ Tempo porta-agulha para trombol tico dentro de 30 minutos
- ✓ Tempo porta-bal o para angioplastia prim ria dentro de 90 minutos



- ✓ Prescrição de terapia antiplaquetária dupla na alta
- ✓ Tempo porta ECG (10 minutos)
- ✓ Terapia na fase aguda do IAM com supra de ST com inibidores seletivos da adenosina difosfato-ADP
- ✓ Agentes anticoagulantes na fase aguda para pacientes com IAM sem supradesnível do segmento ST (IAMSSST)
- ✓ Agentes bloqueadores de aldosterona no momento da alta para os pacientes com IAM
- ✓ Avaliação de colesterol LDL



- ✓ IECA/BRA prescrito para pacientes com disfunção sistólica do VE (FE \leq 40%)
 - ✓ Avaliação dos fatores de risco tromboembólicos
- ✓ Betabloqueador prescrito para pacientes com DAC ou disfunção sistólica do VE, que requerem controle da frequência cardíaca
 - ✓ Terapia anticoagulante prescrita
- ✓ Agendamento de avaliação de INR de acompanhamento para pacientes em tratamento com cumarínicos
 - ✓ Avaliação do risco de sangramento
- ✓ Prescrição de estatina em pacientes com FA e DAC, AVC/AIT, ou DVP.



Outros indicadores de qualidade – FA / AF

- ✓ Antagonista de Aldosterona na disfunção sistólica de VE.
- ✓ Educação ao paciente sobre terapia de anticoagulação
- ✓ Educação ao paciente sobre FA/Flutter atrial.
- ✓ Alta hospitalar com FC <110 bpm
- ✓ Cessaçãõ do tabagismo
- ✓ Varfarina prescrita para FA/Flutter valvar





META

Aumento da adesão as diretrizes assistenciais de cardiologia almejando-se como ideal um patamar acima de 85% do conjunto dos indicadores.





BRONZE: Manutenção acima de 85% do conjunto dos indicadores por 3 meses consecutivos.



PRATA: Manutenção acima de 85% do conjunto dos indicadores por 6 meses consecutivos.



OURO: Manutenção acima de 85% do conjunto dos indicadores por 12 meses consecutivos.



Obrigado!
Thank you!