

DIURÉTICOS

Medicação	Dose Inicial (mg)	Dose máxima (mg)	Intervalo
Diurético de alça			
Furosemida	20	240	4/4;6/6;12/12
Bumetamina	0,5-2,0	10	6/6
Tiazídico			
Hidroclorotiazida	25	100	24/24; 12/12
Clortalidona	12,5	50	24/24
Indapamina	2,5	5,0	24/24
Diurético poupador K			
Espironolactona	25	50	24/24
Amilorida	2,5	20	24/24
Triantereno	25	100	24/24

BETA BLOQUEADORES

Medicação	Seletividade B-receptor	Dose inicial (mg)	Dose alvo (mg)
Bisoprolol	B1- seletivo	1.25	10
Succinato de metoprolol	B1- seletivo	12,5	200
Carvedilol	B1, B2, alfa	3,125	50 (2x) > 85kg 25 (2x) < 85 Kg
Nebivolol	B1 seletivo	1,25	10

IECA/BRA

Medicação	Dose inicial (mg)	Dose Alvo (mg)	Frequência
Captopril	6,25	50-100	3x
Enalapril	2,5	10-20	2x
Lisinopril	2,5	30-35	1x
Ramipril	2,5	5-10	1x
Trandolapril	1,0	4	1x
Perindopril	2,0	16	1x
Candesartan	8,0	32	1x
Valsartan	80	320	1x
Losartan	25	100	1x

INOTRÓPICOS E INODILATADORES

Medicação	Dose inicial (μg)	Dose maxima (μg)
Agonistas beta adrenérgicos		
Dobutamina	2,5 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$ – avaliar ajuste a cada 10 min. Efeito hemodinâmico em até 2 horas	20 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$
Inibidores da fosfodiesterase		
Milrinone	Ataque: 50 $\mu\text{g}/\text{Kg}$ em 10 minutos (evitar se PAS < 110mmHg – risco de hipotensão) Manutenção: 0,375 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$ (necessidade de correção pela função renal)	0,75 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$
Sensibilizadores de cálcio		
Levosimendana	Ataque: 6-12 $\mu\text{g}/\text{Kg}$ em 10 minutos (evitar se PAS < 110mmHg – risco de hipotensão) Manutenção: 0,05-0,1 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$ por 24 horas	0,2 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$

INOTRÓPICOS E VASOPRESSORES NO CHOQUE CARDIOGÊNICO

Medicação	Doses
Inotrópicos beta-agonistas	
Dopamina	5 a 10 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$
Dobutamina	5 a 20 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$
Vasopressores	
Epinefrina	0,05 a 0,5 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$
Norepinefrina	0,2 a 1,0 $\mu\text{g}/\text{Kg}/\text{min}$